

Para proteger sus niños contra las **16 enfermedades mortales**, necesitan estas inyecciones a estas edades:

EDAD	VACUNAS
<p><b>Al tiempo de recién nacido</b></p> 	<p><b>Hep B</b> (hepatitis B)</p>
<p><b>2 Meses</b></p> 	<p><b>Hep B</b> <b>DTaP</b> (difteria, tétanos y tos farina) <b>Hib</b> (haemophilus influenza tipo b) <b>PCV-13</b> (pneumococcal conjúgate) <b>IPV</b> (polio) <b>Rotavirus</b></p>
<p><b>4 Meses</b></p> 	<p><b>DTaP</b> <b>Hib</b> <b>PCV-13</b> <b>IPV</b> <b>Rotavirus</b></p>
<p><b>6 Meses</b></p> 	<p><b>Hep B</b> <b>DTaP</b> <b>Hib</b> <b>PCV-13</b> <b>IPV</b> <b>Rotavirus</b></p>
<p><b>12 – 15 Meses</b></p> 	<p><b>Hep A</b> (hepatitis A) ~ 2 dosis, 6 meses de diferencia <b>DTaP</b> <b>Hib</b> <b>PCV-13</b> <b>MMR</b> (sarampión, rubéola y paperas) <b>Varicella</b> (chicken pox)</p>
<p><b>4 – 6 Años</b></p> 	<p><b>DTaP</b> <b>IPV</b> <b>MMR</b> <b>Varicella</b></p>
<p><b>11 – 12 Años</b></p> 	<p><b>Tdap</b> (tétano, difteria y tos farina) <b>MCV4</b> (meningocócicas conjúgate) <b>HPV</b> (virus del papiloma humano)</p>
<p><b>16 – 18 Años</b></p> 	<p><b>MCV4</b> (meningocócicas conjúgate)</p>
<p><b>Cada 10 Años</b></p> 	<p><b>Td</b> (tétano y difteria)</p>
<p><b>6 Meses – 18 Años</b></p> 	<p><b>Influenza</b> (gripe) ~ cada año</p>

Todos los padres deben guardar una copia del recor de inmunización de su hijos consigo.